

431 Jilguero



Jilguero. Primavera. Adulto. Macho (20-IV).

JILGUERO (*Carduelis carduelis*)**IDENTIFICACIÓN**

11-13 cm. Dorso pardo y partes inferiores claras; obispillo claro; cola blanca y negra; alas negras con una ancha banda amarilla; cabeza con color rojo, blanco y negro; los juveniles tienen la cabeza de color gris blanco uniforme.



Jilguero. Adulto. Dicho de la cabeza



Jilguero. Juvenil: dicho del ala, cabeza y cola.

**ESPECIES SIMILARES**


El diseño de la cabeza hace inconfundibles a los adultos; los juveniles se reconocen por el diseño del ala y la cola.

SEXO

Machos con mayor cantidad de rojo en la cabeza, extendiéndose por detrás del ojo; plumillas nasales negras; pequeñas coberteras negras, si acaso con algo de pardo en las puntas. **Hembras** menos rojo en la cabeza, extendiéndose poco por detrás el ojo; plumillas nasales grises o gris-negro; pequeñas coberteras con un borde ancho de color pardo (a veces tan estrecho como en los machos). Los juveniles no pueden sexarse antes de su muda postjuvenil.



Jilguero. Determinación del sexo. Dicho de la cabeza: arriba macho; abajo hembra.



Jilguero. Determinación del sexo. Dicho del capote: izquierda macho macho; derecha hembra.

431 Jilguero



Jilguero.
Determinación del sexo.
Diseño de
pequeñas
coberturas;
arriba macho;
abajo hembra.



EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juveniles con la cabeza de color pardo, sin manchas rojas y negras.

1º año adulto/2º año primavera con contraste entre las grandes coberturas moladas y las más externas atenuado, menos negras; si han cambiado todas las grandes coberturas el contraste está entre estas y las coberturas primarias.

Adultos con las plumas del ala de la misma generación, sin contrastes.

CUIDAD: hay unos pocos juveniles que realizan una muda postjuvenil completa.



Jilguero.
Determinación de la edad. Diseño de la cabeza;
arriba adulto;
abajo juvenil.



Jilguero.
Estructura de la muda postjuvenil.

● Nueva generación
● Coberturas moladas

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

431 Jilguero



ESTATUS EN ARAGÓN

Presente todo el año, recibiendo migrantes europeos en invierno. Está repartido por toda la Comunidad faltando únicamente en las partes más altas del Pirineo y en zonas deforestadas de la Depresión del Ebro.



Jilguero. Primavera. Adulto. Hembra (04-IV).



Jilguero. Primavera. 2º año. Macho (08-IV).



Jilguero. Primavera. 2º año. Hembra (08-IV).



Jilguero. Primavera. Juvenil (29-VII).




Jilguero. Primavera. Adulto. Macho. Detalle de la cabeza arriba macho (20-IV); abajo hembra (04-IV).




Jilguero. Primavera. Adulto. Macho. Detalle de la cabeza arriba 2º año macho (08-IV); como 2º año hembra (08-IV); abajo juvenil (03-VII).




431 Jilguero



Jilguero. Primavera. Adulto. Dorsal del capote: izquierda macho (20-IV); derecha hembra (04-IV).



Jilguero. Primavera. Dorsal del pecho: arriba izquierda ♂ alto macho (08-IV); arriba derecha ♂ alto hembra (08-IV); izquierda juvenil (03-VII).



Jilguero. Primavera. Dorsal del capote: arriba izquierda ♂ alto macho (08-IV); arriba derecha ♂ alto hembra (08-IV); izquierda juvenil (03-VII).




Jilguero. Primavera. Dorsal de la cola: arriba izquierda ♂ alto macho (08-IV); arriba derecha ♂ alto hembra (08-IV); izquierda juvenil (03-VII).

Jilguero. Primavera. Adulto. Dorsal del pecho: izquierda macho (20-IV); derecha hembra (04-IV).

431 Jilguero



Jilguero. Primavera. Adulto. Dorsal de la cola: izquierda macho (20-IV); derecha hembra (04-IV).



Jilguero. Verano. Primavera. Dorsal del dorso: izquierda macho (20-IV); derecha hembra (04-IV).



Jilguero. Primavera. Adulto. Dorsal de las pequeñas coberturas: arriba macho (20-IV); abajo hembra (04-IV).



Jilguero. Primavera. Dorsal del dorso: arriba izquierda ♂ alto macho (08-IV); arriba derecha ♀ alto hembra (08-IV); izquierda juvenil (03-VII).



Jilguero. Primavera. Dorsal de las pequeñas coberturas: arriba ♂ alto macho (08-IV); como ♂ alto hembra (08-IV); abajo juvenil (03-VII).



431 Jilguero



Jilguero. Primavera. Adulto. Macho: dorso del ala (20-IV).



Jilguero. Primavera. Juvenil: dorso del ala (07-VI).



Jilguero. Primavera. Adulto. Hembra: dorso del ala (04-IV).



Jilguero. Invierno. Adulto. Macho (30-XI).



Jilguero. Primavera. 2º año. Macho: dorso del ala (08-IV).



Jilguero. Invierno. Adulto. Hembra (30-XI).



Jilguero. Primavera. 2º año. Hembra: dorso del ala (08-IV).

431 Jilguero




Jilguero, Invierno, 1º año. Macho (30-XI).



Jilguero, Invierno, 1º año. Dicho de la cabeza: arriba macho (30-XI); abajo hembra (30-XI).



Jilguero, Invierno, 1º año. Hembra (30-XI).



Jilguero, Invierno, Adulto. Dicho del capiroto: izquierda macho (30-XI); derecha hembra (30-XI).



Jilguero, Invierno, Adulto. Dicho de la cabeza: arriba macho (30-XI); abajo hembra (30-XI).



Jilguero, Invierno, 1º año. Dicho del capiroto: izquierda macho (30-XI); derecha hembra (30-XI).

431 Jilguero



Jilguero. Invierno. Adulto. Dorsal del pecho izquierda macho (30-XI); derecha hembra (30-XI).



Jilguero. Invierno. 1º año. Dorsal del pecho izquierda macho (30-XI); derecha hembra (30-XI).



Jilguero. Invierno. Adulto. Dorsal del ala izquierda macho (30-XI); derecha hembra (30-XI).



Jilguero. Invierno. 1º año. Dorsal del ala izquierda macho (30-XI); derecha hembra (30-XI).



Jilguero. Invierno. Adulto. Dorsal de la cola izquierda macho (30-XI); derecha hembra (30-XI).



Jilguero. Invierno. 1º año. Dorsal de la cola izquierda macho (30-XI); derecha hembra (30-XI).

431 Jilguero



Jilguero.
Invierno.
Adulto.
Dorso de las
pequeñas
coberturas:
arriba macho
(30-XI); abajo
hembra (30-
XI).




Jilguero.
Invierno. 1º
año. Dorso de
las pequeñas
coberturas:
arriba macho
(30-XI); abajo
hembra (30-
XI).



Jilguero. Invierno. Adulto. Macho: dorso del ala (30-XI).



Jilguero. Invierno. Adulto. Hembra: dorso del ala (30-XI).



Jilguero. Invierno. 1º año. Macho: dorso del ala (30-XI).



Jilguero. Invierno. 1º año. Hembra: dorso del ala (30-XI).