

430 Verderón común



Verderón común. Primavera. Macho. 13 de junio.

VERDERÓN COMÚN (*Carduelis chloris*)

IDENTIFICACIÓN

14-15 cm. Color verde oliváceo, con pico fuerte y claro; franja alar y laterales de la cola amarillos; **juveniles** más apagados y moteados en vientre y dorso

ESPECIES SIMILARES

De las especies con colores verdes y amarillos, el **Higasa** y **verderón serrano** presentan amplias bandas amarillas en las alas; el **verderón** es de un tamaño mucho menor (11-12 cm.)



Ariba izquierda: verderón serrano; arriba derecha: higasa; abajo: verderón común.

SEXO

Es posible sexar a los juveniles recién salidos del nido: en los **machos**, el amarillo de las primarias 8 a 6 y el de las rectrices exteriores llega hasta el risquio. En las **hembras**, el amarillo de las primarias 8 a 6 y el de las rectrices exteriores no llega hasta el risquio. Despues de la muda **postjuvenil**, **machos** con colores amarillos y verdes más vivos; dorso liso; las **hembras** tienen un color más apagado y fino barreado en el dorso.

EDAD

Puedes reconocer 3 tipos de edad:

Juveniles con aspecto parecido al de las hembras, pero con colores más apagados y barreado en el dorso y partes inferiores; plumaje nuevo.


1º año adulto/2º año primavera con contraste entre las plumas de la cola cambiadas (redondeadas) o retorcidas (parvuleadas por desgaste) y entre las grandes cobertoras madadas y retorcidas; si han cambiado todas las grandes cobertoras hay que buscar el contraste de muda en terciarias o entre plumas del ala y cobertoras primarias o entre primarias resueltas de forma en cónico; coberturas primarias matronales y sin punta gris.

Adultos con las plumas de la cola (redondeadas) y ala de la misma generación, sin contrastes; coberturas primarias con borde verde y punta gris.

CUIDADO: hay **juveniles** que realizan una muda postjuvenil completa.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, terminada entre octubre y noviembre. Muda **postjuvenil** frecuentemente parcial, que incluye las plumas del cuerpo, paupéreas y medianas coberturas y la mayor parte de las grandes coberturas; hay ejemplares que extienden su muda a todos las grandes coberturas y terciarias, llegando en algunos a ser una muda completa; es frecuente también cambiar el par central de la cola, si bien puede ser madada completamente. La muda **postjuvenil** puede durar hasta noviembre dependiendo de la fecha de nacimiento.



Vendrá
a comienzo
de la muda
postjuve-
nil.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Presente todo el año, recibiendo migrantes en invierno. Repartido por toda la Comunidad, más visiblemente en las zonas altas del Pirineo y áreas deforestadas de la Depresión del Ebro.

430 Verderón común

Verderón común. Primavera. Hembra (II-VII).



Verderón común. Invierno. Hembra (VI-XII).



Verderón común. Primavera. Juvenil. Hembra (II-VII).



Verderón común. Invierno. Macho (VI-XII).




Verderón común. Primavera. Juvenil. Macho (VI-VII).



Verderón común.
Extensión
del anielo
junto al nague
de las
primarias
6 a 8
en el
macho;
a la jae
hembra.



430 Verderón común



Verderón común. Extensión del amarillo en la cola: izquierda macho (06-VII); derecha hembra (06-VII).



Verderón común. Primavera. Dibujo de la cadera ambariza izquierda macho (02-VI); ambar derecha hembra (30-IV); izquierda juvenil (09-VII).



Verderón común. Primavera. Dibujo del capote: ambar izquierda macho (02-VI); ambar derecha hembra (06-VII); izquierda juvenil (09-VII).



Verderón común. Invierno. Dibujo del pecho: izquierda macho (03-XII); derecha hembra (03-XII).



Verderón común. Primavera. Dibujo de la cadera ambariza macho (02-VI); ambar derecha hembra (30-IV); izquierda juvenil (09-VII).




Verderón común. Macho. Dibujo de coberturas primarias: ambar adulto (14-VI); abajo: 2º año (14-V).

Verderón común. Invierno. Dibujo de la cadera: izquierda macho (03-XII); derecha hembra (03-XII).

430 Verderón común



Verderón común. Hembra. Detalle de coberturas primarias: arriba adulto (II-V); abajo 2º año (II-V).



Verderón común. Primavera. Detalle del dorso: arriba inquisitilla macho (II-IV); arriba dorscha hembra (II-IV); inquisitilla juvenil (IV-VII).



Verderón. Primavera. Detalle de la cola: arriba inquisitilla adulto 2º año (IV-V); arriba dorscha 2º año (IV-V); inquisitilla juvenil (II-III).



Verderón. Invierno. Detalle de la cola: inquisitilla adulto (II-XII); dorscha 1º año (II-XII).

Verderón común. Invierno. Detalle del dorso: inquisitilla macho (II-XII); dorscha hembra (II-XII).

430 Verderón común



Verdins comunes. Hembra: ala de juvenil (22-VI).



Verdins comunes. Hembra. Muestra postimperial: ala de adulto (06-VI).



Verdins comunes. Macho: ala de juvenil (22-VI).



Verdins comunes. Macho. Muestra postimperial: ala de adulto (02-VI).



Verdins comunes. Hembra. Muestra postjuvenil: ala de 2º año (22-VI).



Verdins comunes. Macho. Muestra postjuvenil: ala de 2º año (02-VI).